INTERVALLI

Dato un valore numerico a , l'insieme dei numeri reali viene diviso in due intervalli. Quelli minori di a , indicati con la notazione $x < a$, e quelli maggiori di a , indicati con $a < x$. Quest'ultimo si indica anche come $x > a$ ma questa notazione è sconsigliata, in quanto il segno $<$ pone a sinistra l'elemento minore, proprio come accade quando i numeri vengono ordinati. Ecco lo schema in cui gli intervalli vengono nominati.

$$x < a \quad \Big| \quad \overset{a}{a} < x$$

Se i valori sono due (ordinati, cioè $a < b$), gli intervalli sono tre, e quello centrale viene indicato con la notazione $a < b$.

$$x < a \quad \Big| \quad \overset{a}{a} < x < b \quad \Big| \quad \overset{b}{b} < x$$

Con tre valori, gli intervalli sono quattro, e così via

$$x < a \quad \Big| \quad \overset{a}{a} < x < b \quad \Big| \quad \overset{b}{b} < x < c \quad \Big| \quad \overset{c}{c} < x$$

Dato un intervallo, ognuno dei suoi estremi (o il suo unico estremo) può anche appartenere all'intervallo stesso. In tal caso viene usata la notazione $\leq$ (minore o uguale a). Ecco alcuni esempi:

$x \leq 3$ I numeri inferiori al 3, compreso il 3 stesso

$-2 \leq x < 1$ I numeri tra -2 compreso e 1 escluso

DISEQUAZIONI POLINOMIALI SCOMPOSTE

Una disequazione polinomiale scomposta è un polinomio scomposto seguito dalla scrittura > 0 (maggiore di 0) o < 0 (minore di 0). Si risolvono dopo averne studiato il segno: la soluzione è costituita dagli intervalli positivi (se c'è > 0) o da quelli negativi (se c'è < 0). Ecco due esempi: nel primo, avente segno $>$, si prendono gli intervalli con segno $+$, nel secondo, avente segno $<$ si prendono quelli con segno $-$.

$5(x-1)^2(x-2)^3(x+1)(x+3)^4 > 0$ <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="padding: 2px 5px;">+</th><th style="padding: 2px 5px;">R</th><th style="padding: 2px 5px;">M</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x-1)^2$</td><td style="padding: 2px 5px;">1</td><td style="padding: 2px 5px;">2</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x-2)^3$</td><td style="padding: 2px 5px;">2</td><td style="padding: 2px 5px;">3</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x+1)$</td><td style="padding: 2px 5px;">-1</td><td style="padding: 2px 5px;">1</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x+3)^4$</td><td style="padding: 2px 5px;">-3</td><td style="padding: 2px 5px;">4</td></tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> $+$ $\begin{array}{c} -3 \\ \parallel \\ \end{array}$ $+$ $\begin{array}{c} -1 \\ \end{array}$ $-$ $\begin{array}{c} 1 \\ \parallel \\ \end{array}$ $-$ $\begin{array}{c} 2 \\ \end{array}$ $+$ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> $x < -3$ $-3 < x < -1$ $2 < x$ </div>	+	R	M	$(x-1)^2$	1	2	$(x-2)^3$	2	3	$(x+1)$	-1	1	$(x+3)^4$	-3	4	$-2x(x-3)^2(x^4+3)(x+2) < 0$ <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="padding: 2px 5px;">-</th><th style="padding: 2px 5px;">R</th><th style="padding: 2px 5px;">M</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">x</td><td style="padding: 2px 5px;">0</td><td style="padding: 2px 5px;">1</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x-3)^2$</td><td style="padding: 2px 5px;">3</td><td style="padding: 2px 5px;">2</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x+2)$</td><td style="padding: 2px 5px;">-2</td><td style="padding: 2px 5px;">1</td></tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> $-$ $\begin{array}{c} -2 \\ \end{array}$ $+$ $\begin{array}{c} 0 \\ \end{array}$ $-$ $\begin{array}{c} 3 \\ \parallel \\ \end{array}$ $-$ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> $x < -2$ $0 < x < 3$ $3 < x$ </div>	-	R	M	x	0	1	$(x-3)^2$	3	2	$(x+2)$	-2	1
+	R	M																										
$(x-1)^2$	1	2																										
$(x-2)^3$	2	3																										
$(x+1)$	-1	1																										
$(x+3)^4$	-3	4																										
-	R	M																										
x	0	1																										
$(x-3)^2$	3	2																										
$(x+2)$	-2	1																										

La presenza dei segni $\leq$ o $\geq$ sta invece ad indicare che vanno presi anche gli zeri del polinomio, e quindi gli intervalli comprenderanno anche gli estremi (usare pertanto il segno $\leq$)

$(x+3)^3(x+1)(x^4+4)(x-3) \leq 0$ <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="padding: 2px 5px;">+</th><th style="padding: 2px 5px;">R</th><th style="padding: 2px 5px;">M</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x+3)^3$</td><td style="padding: 2px 5px;">-3</td><td style="padding: 2px 5px;">3</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x+1)$</td><td style="padding: 2px 5px;">-1</td><td style="padding: 2px 5px;">1</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x-3)$</td><td style="padding: 2px 5px;">3</td><td style="padding: 2px 5px;">1</td></tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> $-$ $\begin{array}{c} -3 \\ \end{array}$ $+$ $\begin{array}{c} -1 \\ \end{array}$ $-$ $\begin{array}{c} 3 \\ \end{array}$ $+$ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> $x \leq -3$ $-1 \leq x \leq 3$ </div>	+	R	M	$(x+3)^3$	-3	3	$(x+1)$	-1	1	$(x-3)$	3	1	$-3x(x+2)^3(x-4)(x-3)^2 \geq 0$ <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="padding: 2px 5px;">-</th><th style="padding: 2px 5px;">R</th><th style="padding: 2px 5px;">M</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">x</td><td style="padding: 2px 5px;">0</td><td style="padding: 2px 5px;">1</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x+2)^3$</td><td style="padding: 2px 5px;">-2</td><td style="padding: 2px 5px;">3</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x-4)$</td><td style="padding: 2px 5px;">4</td><td style="padding: 2px 5px;">1</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">$(x-3)^2$</td><td style="padding: 2px 5px;">3</td><td style="padding: 2px 5px;">2</td></tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> $+$ $\begin{array}{c} -2 \\ \end{array}$ $-$ $\begin{array}{c} 0 \\ \end{array}$ $+$ $\begin{array}{c} 3 \\ \parallel \\ \end{array}$ $+$ $\begin{array}{c} 4 \\ \end{array}$ $-$ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> $x \leq -2$ $0 \leq x \leq 3$ $3 \leq x \leq 4$ </div>	-	R	M	x	0	1	$(x+2)^3$	-2	3	$(x-4)$	4	1	$(x-3)^2$	3	2
+	R	M																										
$(x+3)^3$	-3	3																										
$(x+1)$	-1	1																										
$(x-3)$	3	1																										
-	R	M																										
x	0	1																										
$(x+2)^3$	-2	3																										
$(x-4)$	4	1																										
$(x-3)^2$	3	2																										

DISEQUAZIONI FRATTE SCOMPOSTE

Nelle disequazioni fratte sono simili a quelle polinomiali, ma anziché un polinomio c'è una funzione razionale. In presenza dei segni $<$ o $>$ si risolvono esattamente come quelle polinomiali, non serve fare distinzioni fra le radici del numeratore e quelle del denominatore.

$-\frac{2x^3(x+2)}{5(x-3)^2(x+3)^3} > 0$ <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">R</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">x^3</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x+2)$</td><td style="text-align: center;">-2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x-3)^2$</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x+3)^3$</td><td style="text-align: center;">-3</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> $+ \quad \quad - \quad \quad + \quad \quad - \quad \quad -$ $\quad \quad -3 \quad \quad -2 \quad \quad 0 \quad \quad 3$ $x < -3 \quad \quad -2 < x < 0$ </div>	-	R	M	x^3	0	3	$(x+2)$	-2	1	$(x-3)^2$	3	2	$(x+3)^3$	-3	3	$\frac{3x^4(x-3)^2}{4(x+2)(x+4)^2} < 0$ <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">+</td><td style="text-align: center;">R</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">x^4</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x-3)^2$</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x+2)$</td><td style="text-align: center;">-2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x+4)^2$</td><td style="text-align: center;">-4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> $- \quad \quad - \quad \quad + \quad \quad + \quad \quad +$ $\quad \quad -4 \quad \quad -2 \quad \quad 0 \quad \quad 3$ $x < -4 \quad \quad -4 < x < -2$ </div>	+	R	M	x^4	0	4	$(x-3)^2$	3	2	$(x+2)$	-2	1	$(x+4)^2$	-4	2
-	R	M																													
x^3	0	3																													
$(x+2)$	-2	1																													
$(x-3)^2$	3	2																													
$(x+3)^3$	-3	3																													
+	R	M																													
x^4	0	4																													
$(x-3)^2$	3	2																													
$(x+2)$	-2	1																													
$(x+4)^2$	-4	2																													

In presenza di $\leq$ o $\geq$ (che, come già precisato, indicano che gli zeri della funzione fanno parte della soluzione), la situazione cambia radicalmente. Bisogna mettere il segno $\leq$ solo in corrispondenza degli zeri, ossia delle radici del numeratore (rappresentati, nello schema dei segni, da pallini), mentre in corrispondenza delle radici del denominatore (crocette) si continua a metter $<$.

$-\frac{3(x^2+2)(x+3)^3}{x^2(x-2)^3} \leq 0$ <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">-</td><td></td><td style="text-align: center;">R</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x+3)^3$</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="text-align: center;">-3</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">x^2</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x-2)^3$</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> $- \quad \quad + \quad \quad + \quad \quad -$ $\quad \quad -3 \quad \quad 0 \quad \quad 2$ $x \leq -3 \quad \quad 2 < x$ </div>	-		R	M	$(x+3)^3$	N	-3	3	x^2	D	0	2	$(x-2)^3$	D	2	3	$\frac{2x^3(x+2)}{5(x-3)^2(x+3)^3} \geq 0$ <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">+</td><td></td><td style="text-align: center;">R</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">x^3</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x+2)$</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="text-align: center;">-2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x-3)^2$</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">$(x+3)^3$</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">-3</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> $- \quad \quad + \quad \quad - \quad \quad + \quad \quad +$ $\quad \quad -3 \quad \quad -2 \quad \quad 0 \quad \quad 3$ $-3 < x \leq 2 \quad \quad 0 \leq x < 3 \quad \quad 3 < x$ </div>	+		R	M	x^3	N	0	3	$(x+2)$	N	-2	1	$(x-3)^2$	D	3	2	$(x+3)^3$	D	-3	3
-		R	M																																		
$(x+3)^3$	N	-3	3																																		
x^2	D	0	2																																		
$(x-2)^3$	D	2	3																																		
+		R	M																																		
x^3	N	0	3																																		
$(x+2)$	N	-2	1																																		
$(x-3)^2$	D	3	2																																		
$(x+3)^3$	D	-3	3																																		